

Załącznik do programu Rady Wydziału

imię i nazwisko Alicja Jakielaszek

data urodzenia 26.01.1987

adres e-mailowy alicja-j@wp.pl , jakielaszek.alicja@gmail.com

wykształcenie- data ukończenia studiów Wydział Lekarski Oddział Stomatologiczny , Łódź
09.09.2011

miejsce pracy NZOZ DUODENT, ul.Gogoła 12 ,92-513Łódź ,M-Dental ul.Sonaty 6d, 02-744
Warszawa

doświadczenie zawodowe/ specjalizacja 6-letnia Praktyka lekarza dentysty

dorobek naukowy: prace opublikowane/komunikaty zjazdowe krajowe /zagraniczne-liczba 1
opublikowana praca w kwartalniku e-Dentico

„Ocena zależności pomiędzy nieprawidłowościami okluzji a zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego u pacjentów dorosłych „

„Occlusion abnormalities and temporomandibular disorders in adult patients”

tytuł pracy w języku polskim i angielskim

słowa kluczowe /max 4/ TMJ, okluzja, układ stomatognatyczny , zaburzenia czynnościowe

promotor: dr hab.n.med. Agata Czajka -Jakubowska

promotor pomocniczy : dr n.med Zofia Maciejewska -Szaniec

założenia i cel pracy: ocena: częstości występowania złożonych nieprawidłowości zgryzowych u pacjentów zgłaszających się w celu leczenia stomatologicznego ,występowania objawów i oznak dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia wśród pacjentów z nieprawidłowościami okluzji; ustalenie współwystępowania nieprawidłowości okluzyjnych z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego, oszacowanie wpływu zaburzeń okluzji na występowanie dysfunkcji układu stomatognatycznego

materiał i metodyka pracy: Grupa pacjentów zgłaszająca się w celu leczenia stomatologicznego w wieku 23-30 lat z pełnymi łukami zębowymi ,nie leczona ortodontycznie, bez urazów w obrębie twarzoczaszki, u których występują nieprawidłowości okluzyjne .U pacjentów zostanie wykonane badanie podmiotowe i przedmiotowe przy użyciu kwestionariusza RDC-TMD (kalibracja w Klinice Rehabilitacji Narządu Żucia)

wyniki spodziewane/uzyskane: U pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia w większym stopniu występują nieprawidłowości zwarciove w porównaniu do grupy kontrolnej.Wydaje się że ,zwiększony nagryz pionowy, poziomy , stłoczenia oraz zaburzenia linii pośrodkowej większej niż 4 mm mają znaczenie dla rozwoju dysfunkcji.

/czcionka Times New Roman 12, odstęp 1/